

## *¿Debe Mantener a Su Hijo en Casa?*

**Varicela:** *¿Debe mantener a su hijo en casa?*

**Sí.** Los niños con varicela sin complicaciones podrán regresar a la escuela al sexto día después del inicio del sarpullido, o cuando se hayan secado las ampollas hasta formar costras —cualquiera de los dos lapsos de tiempo que sea el mayor.

**Conjuntivitis:** *¿Debe mantener a su hijo en casa?*

**Sí.** Los estudiantes podrán regresar a la escuela 24 horas después del inicio del tratamiento.

**Tos:** *¿Debe mantener a su hijo en casa?*

**Sí.** Mantenga a su hijo en casa si la tos es persistente y productiva, con secreciones nasales gruesas o continuas.

**Diarrea:** *¿Debe mantener a su hijo en casa?*

**Sí.** Mantenga a su hijo en casa si ha sufrido 3 o más episodios de diarrea. Su hijo deberá permanecer en casa durante 24 horas después del último episodio de diarrea, sin la necesidad de tomar ningún medicamento.

**Fiebre:** *¿Debe mantener a su hijo en casa?*

**Sí.** Mantenga a su hijo en casa si su temperatura es de 100 °F, o mayor. Mantenga a su hijo en casa hasta que esté libre de fiebre durante 24 horas, sin la necesidad de tomar ningún medicamento para la reducción de fiebre.

**Piojos:** *¿Debe mantener a su hijo en casa?*

**Sí.** Si algún estudiante tiene piojos **vivos**, se le pedirá retirarse de la escuela. Los estudiantes que sólo tengan liendres (huevecillos de piojo) podrán permanecer en clase. Los estudiantes que se envíe a casa con piojos vivos podrán regresar a la escuela una vez iniciado el tratamiento, **sólo si** vienen acompañados de uno de sus padres de familia, o traen consigo una nota firmada que certifique que se ha iniciado el tratamiento. Antes de regresar al salón de clases, se completará un chequeo —realizado por un miembro designado del personal— para confirmar que el estudiante no tiene piojos vivos. Los alumnos que regresen a la escuela tras haberseles enviado a casa, y que ahora sólo tengan liendres, deberán someterse a chequeos periódicos, para confirmar la ausencia continua de piojos vivos.

**Impétigo:** *¿Debe mantener a su hijo en casa?*

**Sí.** Su hijo podrá regresar a la escuela 48 horas después de haberse iniciado el tratamiento, o al presentarse una nota de dada de alta por parte del médico. El estudiante deberá llevar sus llagas cubiertas al regresar a la escuela.

**Faringitis Estreptocócica:** *¿Debe mantener a su hijo en casa?*

**Sí.** Su hijo podrá regresar a la escuela 24 horas después de iniciado el tratamiento, y una vez desaparecida su fiebre.

**Vómito:** *¿Debe mantener a su hijo en casa?*

**Sí.** Mantenga a su hijo en casa durante 24 horas después del último episodio de vómito, sin la necesidad de tomar ningún medicamento.

Con el fin de proteger a los demás estudiantes y a los miembros del personal, se enviará a casa a su hijo si, durante el transcurso del día escolar, se le descubre —o se le sospecha tener— cualesquiera de estos síntomas, condiciones o enfermedades.

**Resfriado (con síntomas leves: vías nasales congestionadas con secreciones color claro; estornudo; tos leve):**

*¿Debe mantener a su hijo en casa?*

**No.** Su hijo podrá asistir a la escuela, siempre y cuando pueda participar en las actividades escolares.

**Eritema Infeccioso (Quinta Enfermedad):** *¿Debe mantener a su hijo en casa?*

**No.** Una vez que desaparece el sarpullido, no es posible contagiar a otros de la enfermedad —por lo que no es necesario que su hijo permanezca en casa.

**Tiña:** *¿Debe mantener a su hijo en casa?*

**No.** El estudiante deberá cubrir las áreas afectadas al regresar a la escuela.

**Roble Venenoso:** *¿Debe mantener a su hijo en casa?*

**No.** El roble venenoso no es contagioso. Su hijo podrá asistir a la escuela. Al regresar a la escuela, su hijo deberá cubrir las áreas de piel abierta que pueda tener.